

MINOXIDIL MYLAN 2 %

Mis à jour : Jeudi, 19 Septembre 2013.

Traitement de la chute des cheveux

Dans quel cas le médicament MINOXIDIL MYLAN 2 % est-il prescrit ?

Ce médicament contient une substance qui stimule la pousse des cheveux et ralentit leur chute.

Il est utilisé dans le traitement de la chute modérée des cheveux d'origine hormonale chez l'homme ou chez la femme.

Le minoxidil est également un vasodilatateur utilisé par voie orale dans le traitement de l'hypertension artérielle. Appliqué localement sur le cuir chevelu, l'effet antihypertenseur du minoxidil est généralement imperceptible.

Présentations du médicament MINOXIDIL MYLAN 2 %

MINOXIDIL MYLAN 2 % : solution pour application cutanée ; 3 flacons de 60 ml
- Non remboursé - Prix libre

Composition du médicament MINOXIDIL MYLAN 2 %

	p 100 ml
Minoxidil	2 g
Alcool	+
Propylèneglycol	+
Substance active : Minoxidil	
Excipients : Eau purifiée, Éthanol, Propylèneglycol	

Attention

Ce médicament ne doit pas être utilisé chez les adultes de moins de 18 ans ou de plus de 65 ans sans avis médical. Ce traitement n'est pas adapté aux chutes de cheveux brutales, consécutives à une maladie ou à un traitement médicamenteux. Il ne doit pas être appliqué ailleurs que sur le crâne.

Des précautions sont nécessaires chez les personnes souffrant de troubles cardiaques.

Une affection dermatologique du cuir chevelu doit être traitée avant l'application de ce médicament.

En cas d'application accidentelle sur les yeux, les muqueuses ou la peau abîmée, rincez abondamment.

Fertilité, grossesse et allaitement

La sécurité d'emploi de ce médicament pendant la grossesse ou l'allaitement n'a pas été établie. Par mesure de prudence, son usage est déconseillé.

Mode d'emploi et posologie du médicament MINOXIDIL MYLAN 2 %

Sur des cheveux parfaitement secs, appliquer la solution du centre vers la périphérie de la région à traiter.

Se laver soigneusement les mains après usage.

Habituellement, le traitement n'est efficace qu'au bout de 4 mois ou plus : pour en garder le bénéfice, il ne devrait jamais être interrompu.

Posologie usuelle :

- Adulte : 1 application de 1 ml (quelle que soit la surface à traiter), 2 fois par jour. 1 application correspond à 7 pulvérisations.

Une augmentation de la dose n'augmente pas l'efficacité du traitement et expose à un risque accru d'effets indésirables.

Conseils

En cas d'exposition au soleil, il est recommandé de se couvrir la tête avec un chapeau ou une casquette.

Ce produit est inflammable : conservez-le à l'abri de la chaleur.

Effets indésirables possibles du médicament MINOXIDIL MYLAN 2 %

Réactions mineures : irritation, sécheresse de la peau, pousse excessive des poils en dehors de la région traitée.

Rarement : allergie, vertiges, maux de tête, irritation des yeux, altération du goût, troubles visuels, otite externe, faiblesse, œdème, névrite.

Exceptionnellement : perte des cheveux (effet paradoxal), douleur thoracique, modification de la tension artérielle et des transaminases.