

Cortisédermyl

DÉMANGEAISONS

Hydrocortisone 0,5 %

Lisez attentivement cette notice car elle contient des informations importantes.

- Ce médicament est une spécialité d'AUTOMEDICATION qui peut être utilisée sans consultation ni prescription d'un médecin.
- La persistance des symptômes au delà de 3 jours, l'aggravation ou l'apparition de nouveaux troubles, imposent de prendre un avis médical.
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien ou à votre médecin.

- **La substance active est** : Hydrocortisone 0,50 g pour 100 g
- **Les autres composants sont** : Alcool stéarylique, alcool cétylique, alcool isopropylique, graisse de laine, stéarate de macrogol 1 000, stéarate de macrogol 4 000, stéarate de macrogol 6 000, eau distillée de laurier cerise.

Titulaire / Exploitant / Fabricant

COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE - Place Lucien Auvert 77020 MELUN CEDEX

QU'EST-CE QUE CORTISÉDERMYL 0,5 %, crème ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ?

Ce médicament se présente sous forme de crème. Tube de 15 g.

Ce médicament contient un corticoïde.

Ce médicament est indiqué CHEZ L'ADULTE ET L'ENFANT DE PLUS DE 6 ANS,

en cas de :

- piqûres d'orties,
- piqûres d'insectes,
- coups de soleil localisés.

QUELLES SONT LES INFORMATIONS NECESSAIRES AVANT D'UTILISER CORTISÉDERMYL 0,5 %, crème?

Ne pas utiliser pour vous (ou votre enfant) CORTISÉDERMYL 0,5 %, crème :

- en cas d'allergie à l'hydrocortisone ou à l'un des composants de la crème (voir composition),
- sur des plaies,
- sur une acné,
- sur une rosacée,
- sur une peau infectée, que l'origine soit bactérienne (par exemple impétigo...), virale (herpès, zona, varicelle), mycosique (due à des champignons microscopiques) ou parasitaire.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Prendre des précautions particulières avec CORTISÉDERMYL 0,5 %, crème :

NE LAISSEZ PAS CE MEDICAMENT A LA PORTEE DES ENFANTS.

En cas d'apparition de cloques après un coup de soleil, **consultez votre médecin avant** l'application du produit.

Précautions d'emploi :

Ce médicament contient un corticoïde, respectez le mode d'utilisation.

En effet, une augmentation de la quantité appliquée et/ou du nombre d'applications n'améliorerait ni l'activité, ni la rapidité d'action du produit mais pourrait provoquer des effets indésirables.

- Ne traitez pas de grandes surfaces.
- Ne pas recouvrir d'un pansement fermé (pansement occlusif), car cela pourrait entraîner le passage d'une partie du principe actif dans le sang.
- N'appliquez pas d'autres produits à usage dermatologique sur la surface traitée.
- Ne pas utiliser plus de 2 fois par jour.
- Ne dépassez pas la durée d'utilisation recommandée (3 jours).

- Ce médicament contient de la graisse de laine et de l'alcool stéarylique et peut provoquer des réactions cutanées locales (par exemple eczéma).
 - Si les symptômes persistent au-delà de 3 jours de traitement, prenez l'avis de votre médecin.
- En cas de :
- intolérance locale,
 - irritation, surinfection cutanée,
- interrompez le traitement et consultez votre médecin.

Grossesse

En cas de besoin, ce médicament peut être utilisé pendant la grossesse.
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament

Allaitement

L'allaitement est possible en cas de traitement par ce médicament.
Ne pas appliquer sur les seins lors de l'allaitement, en raison du risque d'ingestion du produit par le nouveau-né.
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament

Excipient à effet notoire : graisse de laine, alcool stéarylique.

Prise ou utilisation d'autres médicaments :

Veillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance, notamment s'il s'agit d'un traitement dermatologique.

COMMENT UTILISER CORTISÉDERMYL 0,5 %, crème?

Voie cutanée.

- Appliquer la crème 2 fois par jour, matin et soir.
- Appliquez le produit en couche mince, puis étalez-le en massant légèrement jusqu'à ce qu'il soit entièrement absorbé.
- Lavez-vous les mains après l'application.

La durée d'utilisation est limitée à 3 jours.

La persistance des symptômes au-delà de 3 jours nécessite de prendre un avis médical.

QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, CORTISÉDERMYL 0,5 % crème est susceptible d'avoir des effets indésirables.

- risque d'amincissement de la peau, de dilatation de petits vaisseaux sanguins, de vergetures, de poussée d'acné, de rougeurs et d'irritations autour de la bouche;
- des cas de développement exagéré du système pileux, de trouble de la coloration de la peau, d'infection secondaire en particulier en cas de traitement prolongé, sous pansement occlusif ou dans les plis, ont été rapportés;
- en raison de la présence de graisse de laine, risque d'eczéma (réaction allergique de la peau).

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

COMMENT CONSERVER CORTISÉDERMYL 0,5 % crème?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

A conserver à une température ne dépassant pas 30°C.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte, le tube.

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est janvier 2004.

AN08180003



Place Lucien Auvert - 77020 Melun cedex