

# Drontal<sup>®</sup> Chien

Comprimé appétent  
Arôme viande

Vermifuge contre les vers ronds et les vers plats



**Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, du fabricant responsable de la libération des lots et de l'exploitant :**

**Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché :**

Bayer HealthCare, 220 av de la Recherche, 59120 Loos

**Fabricant :**

KVP Pharma + Veterinar Produkte, Projendsdorfer Strasse 324,  
24106 Kiel, Allemagne

**Exploitant :**

Bayer HealthCare Division Animal Health, 13 Rue Jean Jaurès,  
92807 Puteaux Cedex

**Dénomination du médicament**

Drontal Chien

**Liste des substances actives**

Un comprimé contient :

Fébanтел	150 mg
Pyrantel	50 mg
(sous forme d'émbonate)	
(soit 144 mg d'émbonate de pyrantel)	
Praziquantel	50 mg

**Forme pharmaceutique**

Comprimé marron clair à marron, aromatisé à la viande, en forme d'os avec une barre de scélabilité sur les deux faces, permettant de le couper en deux parties égales.

**Indications**

Chez les chiens, traitement des infestations mixtes par les nématodes et les cestodes suivants :

**Vers ronds :**

Ascarides (adultes matures et immatures) : *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*  
Ancylostomes (adultes) : *Uncinaria stenocephala*, *Ancylostoma caninum*

Trichocéphales (adultes) : *Trichouris vulpis*

**Vers plats (adultes matures et immatures) :**

*Echinococcus granulosus*, *Echinococcus multilocularis*, *Dipylidium caninum*,  
*Taenia* spp

**Contre-indications**

Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité à l'une des substances actives ou à l'un des excipients.

Ne pas administrer aux chiennes gestantes durant le premier et le deuxième tiers de gestation (voir rubrique « Utilisation en cas de gestation ou de lactation »).

**Effets indésirables**

Dans de très rares cas, des troubles digestifs légers et transitoires (ex : vomissements) peuvent être observés.

La fréquence des effets indésirables est définie selon la convention suivante :

- très rare (moins d'un animal sur 10 000, y compris les cas isolés)

Si vous observez des effets indésirables graves ou d'autres effets non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre vétérinaire.

**Espèce cible**

Chiens.

**Posologie et voie d'administration**

Pour administration orale uniquement.

**Dosage**

Pour le traitement des chiens, 1 comprimé pour 10 kg de poids corporel (15 mg de fébanтел, 5 mg de pyrantel (14,4 mg d'émbonate de pyrantel) et 5 mg de praziquantel par kg), soit :

Poids de l'animal (kg)	Nombre de comprimés
2 - 5	
>5 - 10	
>10 - 15	
>15 - 20	

Administrer un demi-comprimé supplémentaire par tranche de 5 kg supplémentaire.

**Mode d'administration et durée du traitement :**

Les comprimés sont aromatisés et les études ont montré qu'ils étaient appétents

avec une prise volontaire par la majorité des animaux testés (88 %). Les comprimés peuvent être administrés avec ou sans nourriture. L'accès à la nourriture n'a pas besoin d'être restreint avant ou après traitement. Les comprimés doivent être donnés en une fois.

Demander conseil à un vétérinaire sur la nécessité de répéter un traitement et sur sa fréquence.

Ne pas utiliser chez les chiens pesant moins de 2 kg.

**Précautions de conservation**

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Ne pas conserver ce médicament au-delà de la date de péremption indiquée après EXP sur le carton et la plaquette thermoformée. Cette date correspond au dernier jour du mois indiqué.

Après ouverture de la plaquette thermoformée, les demi-comprimés restants doivent être enveloppés dans une feuille d'aluminium et remis dans leur plaquette d'origine. Ne pas conserver ces demi-comprimés plus de 7 jours.

**Mises en garde particulières**

**Précautions particulières d'emploi chez les animaux**

L'usage fréquent et répété d'un anthelminthique d'une même classe peut conduire au développement de résistance aux anthelminthiques de cette classe.

Afin de minimiser le risque de ré-infestations et de nouvelles infestations, les féces doivent être ramassées et éliminées de manière appropriée pendant les 24 heures suivant le traitement.

Les puces servent d'hôtes intermédiaires pour l'un des vers plats les plus communs : *Dipylidium caninum*. L'infestation par les vers plats peut réapparaître à moins que des mesures de contrôle contre les hôtes intermédiaires comme les puces, les souris, etc... ne soient entreprises.

**Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux**

En cas d'ingestion accidentelle, consulter immédiatement un médecin et lui montrer la notice ou l'étiquette.

Par mesure d'hygiène, les personnes qui administrent le produit doivent se laver les mains après l'avoir administré directement dans la gueule du chien ou après l'avoir ajouté à son alimentation.

**Autres précautions**

Puisqu'il contient du praziquantel, ce produit est efficace contre *Echinococcus* spp. Le parasite n'est pas présent dans tous les états membres de l'UE mais devient plus fréquent dans certains états. L'échinococose représente un danger pour l'homme. L'échinococose est une maladie à déclaration obligatoire auprès de l'Organisation mondiale pour la santé animale (OIE); les instructions spécifiques de traitement, de suivi et de protection des personnes sont à demander aux autorités compétentes concernées.

**Utilisation en cas de gestation ou de lactation**

Des effets tératogènes, attribués à l'administration de fortes doses de fébanтел dans les premiers stades de gestation, ont été observés chez le rat, le mouton et le chien.

L'innocuité du médicament dans les premier et deuxième tiers de gestation n'a pas été testée. Ne pas utiliser le médicament chez les chiennes gestantes durant le premier et deuxième tiers de gestation (voir rubrique « Contre-indications »). L'innocuité d'un traitement unique dans le dernier tiers de gestation ou pendant la lactation a été démontrée.

**Interactions médicamenteuses et autres incompatibilités**

Les effets anthelminthiques de ce médicament et des produits contenant de la pipérazine peuvent être antagonistes quand ils sont utilisés concomitamment.

**Surdosage**

Une administration à 10 fois la dose recommandée a été tolérée sans effet secondaire chez les chiens et les chats.

**Précautions particulières à prendre lors de l'élimination de médicaments non utilisés ou de déchets dérivés de l'utilisation de ces médicaments**

Les conditionnements vides et tout reliquat de produit doivent être éliminés suivant les pratiques en vigueur régies par la réglementation sur les déchets.

**Numéro d'autorisation de mise sur le marché**

FR/0871727 6/2014

**Date de la dernière notice approuvée**

Janvier 2015

Bayer