

## NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

**KARDEGIC® 160 mg**  
*acétylsalicylate de DL-Lysine*

poudre pour solution buvable en sachet-dose

**Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.**

- . Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- . Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- . Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- . Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

### Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que Kardegic 160 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Kardegic 160 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose ?
3. Comment prendre Kardegic 160 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Kardegic 160 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose ?
6. Informations supplémentaires.

### **1. QU'EST-CE QUE KARDEGIC 160 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?**

ANTI-THROMBOTIQUE / INHIBITEUR DE L'AGRÉGATION PLAQUETTAIRE, HÉPARINE EXCLUE.

Ce médicament contient de l'aspirine, mais ce dosage est plus particulièrement destiné au traitement de certaines affections du cœur ou des vaisseaux, seul ou associé aux autres traitements prescrits par votre médecin. Il ne devra pas être entrepris sans l'avis de celui-ci, seul juge de l'établissement et de la conduite de ce traitement.

### **2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE KARDEGIC 160 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose ?**

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

**Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants :**

- en cas d'ulcère de l'estomac ou du duodénum en évolution,
- en cas d'allergie connue à l'aspirine ou aux anti-inflammatoires non stéroïdiens (telle qu'éruption cutanée ou asthme),
- en cas de maladie hémorragique,
- en cas de traitement concomitant par le méthotrexate, ou par les anticoagulants oraux, lorsque l'aspirine est prescrite à fortes doses (> 3 g/j),
- en dehors d'utilisations extrêmement limitées, et qui justifient une surveillance spécialisée, tout médicament à base d'aspirine est CONTRE-INDIQUÉ à partir du 6<sup>ème</sup> mois de la grossesse (voir Grossesse et allaitement).

**Ce médicament ne doit généralement pas être utilisé, sauf avis contraire de votre médecin, en cas de :**

- goutte,
- règles ou saignements gynécologiques anormaux,
- traitement concomitant par les anticoagulants oraux (notamment lorsque l'aspirine est prescrite à faibles doses) ou par l'héparine, les uricosuriques, ou d'autres anti-inflammatoires (notamment lorsque l'aspirine est prescrite à des doses > 3 g/j) (voir Prise ou utilisation d'autres médicaments).

L'allaitement est déconseillé pendant le traitement (voir Grossesse et allaitement).

## Faites attention avec Kardegic 160 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose

### Mises en garde spéciales

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

### Précautions d'emploi

Il est important de signaler à votre médecin certains problèmes de santé ou situations :

- maladie des reins,
- asthme,
- antécédent d'ulcère de l'estomac ou du duodénum, ou d'hémorragies digestives, hypertension artérielle,
- diabète,
- port de stérilet.

L'aspirine augmente les risques hémorragiques et ceci dès les très faibles doses et même lorsque la prise date de plusieurs jours. Prévenir votre médecin traitant, le chirurgien, l'anesthésiste ou simplement votre dentiste au cas où un geste chirurgical, même mineur, est envisagé.

Ce médicament ne contenant pas de sodium (sel), il peut être administré en cas de régime désodé ou hyposodé.

### Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien, notamment si vous prenez des anticoagulants oraux (notamment lorsque l'aspirine est prescrite à faibles doses) ou de l'héparine, des uricosuriques ou d'autres anti-inflammatoires (notamment lorsque l'aspirine est prescrite à des doses > 3 g/j).

Ce médicament contient de l'aspirine. D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas sans en parler à votre médecin ou à votre pharmacien afin de ne pas dépasser les doses maximales conseillées.

### Grossesse et allaitement

Au cours de votre grossesse, votre médecin spécialiste peut être amené, si nécessaire, à vous prescrire ce médicament qui contient de l'aspirine à doses très faibles. Ces doses ne sont pas celles utilisées dans le traitement de la fièvre ou de la douleur.

Si tel est le cas, il est très important :

- de respecter scrupuleusement l'ordonnance de votre médecin traitant, sans dépasser les doses prescrites,
- à partir du 6<sup>ème</sup> mois de la grossesse, de ne prendre aucun AUTRE médicament contenant de l'aspirine.

Ce médicament passe dans le lait maternel. En conséquence, l'allaitement est déconseillé.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

### Informations importantes concernant certains composants de Kardegic 160 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose

Ce médicament contient du lactose.

## 3. COMMENT PRENDRE KARDEGIC 160 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose ?

### Posologie

Réservé à l'adulte.

Ce médicament ne sera administré que sur prescription médicale.

La posologie usuelle recommandée est de 1 sachet par jour.

*SE CONFORMER STRICTEMENT À L'ORDONNANCE DE VOTRE MÉDECIN.*

### Mode d'administration

Voie orale.

Verser le contenu du sachet dans un grand verre. Ajouter de l'eau. Une dissolution totale est obtenue rapidement.

### Fréquence d'administration

*SE CONFORMER STRICTEMENT À L'ORDONNANCE DE VOTRE MÉDECIN.*

### Durée du traitement

*SE CONFORMER STRICTEMENT À L'ORDONNANCE DE VOTRE MÉDECIN.*

**Si vous avez pris plus de Kardegic 160 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose que vous n'auriez dû**  
Consulter rapidement un médecin en cas de surdosage accidentel (en particulier s'il s'agit d'un enfant).

**Si vous oubliez de prendre Kardegic 160 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose**  
Continuez votre traitement mais prévenez votre médecin.

#### **4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?**

Comme tous les médicaments, Kardegic 160 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet :

- Il est possible que surviennent des douleurs de l'estomac, des nausées, des saignements de nez, des gencives, des douleurs du ventre. Il faut en avertir votre médecin.
- Dans certains cas rares, il est possible que surviennent une hémorragie (émission de selles noires, de vomissements sanglants), une éruption sur la peau, une crise d'asthme, un brusque gonflement du visage et du cou d'origine allergique pouvant aller jusqu'à une allergie généralisée. Il faut immédiatement arrêter le traitement et avertir votre médecin.
- Exceptionnellement, sont rapportés : bourdonnements d'oreille, sensation de baisse de l'audition, maux de tête. Ils traduisent habituellement un surdosage en aspirine.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

#### **5. COMMENT CONSERVER KARDEGIC 160 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose ?**

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser Kardegic 160 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose après la date de péremption mentionnée sur la boîte. La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.

À conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Conserver les sachets dans l'emballage extérieur, à l'abri de l'humidité.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

#### **6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES**

**Que contient Kardegic 160 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose ?**

**La substance active est :**

Acétylsalicylate de DL-Lysine .....	288 mg
Quantité correspondante en acide acétylsalicylique .....	160 mg

pour un sachet-dose.

**Les autres composants sont :**

Glycine, arôme mandarine (contenant du lactose), glycyrrhizate d'ammonium.

**Qu'est ce que Kardegic 160 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose et contenu de l'emballage extérieur ?**

Ce médicament se présente sous forme de poudre pour solution buvable en sachet-dose (Boîte de 30).

**Titulaire et exploitant**

sanofi-aventis France

1-13, boulevard Romain Rolland

75014 Paris – France

Information Patient : N° vert 0800 222 555

Appel depuis l'étranger : +33 1 57 63 23 23

**Fabricant**

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

45200 Amilly – France

ou

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

21800 Quétigny – France

ou

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

60205 Compiègne – France

**La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est : Juillet 2008\_EEN.**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site internet de l'Afssaps (France).